
Washingtonia de California



La ï***Washingtonia filifera*** ï(Linden ex Andr ï) H. Wendl. (1879) es nativa del sur-oeste de EE.UU. (Arizona y California), y al noroeste de Mexico (norte de Baja California), donde crece en lugares semi-des ï rticos en la parte inferior de los ca ï ones, donde el agua est ï presente, o cerca de fuentes naturales.
El g ï nero comprende s ï lo dos especies , fue dedicado al primer presidente de los Estados Unidos George Washington. El nombre de la especie deriva de los filamentos presentes entre los segmentos foliares.
Es conocida en los pa ï ses de habla Inglesa como ï Palmito de California ï , Washington, palma, palmito Desierto, y Petticoat palma.
Presenta un solitario y s ï lido tronco, de unos 60-80 cm. de di ï metro, de color gris ï ceo en su parte m ï s antigua, marr ï n-rojizo en los j ï venes; con una, altura de hasta unos 20 metros y con la base ensanchada. En la naturaleza se encuentra cubierta de hojas viejas y secas en la parte superior , de ahi proviene el nombre com ï n con el que se le conoce: Petticoat palma. Hojas costapalmadas de color verde claro opaco, segmentos b ï fidos, y con numerosos filamentos colgando de la parte terminal en la planta adulta , el pec ï olo presenta espinas blanquecinas, que tienden a distanciarse cerca de la l ï mina foliar.
Inflorescencias arqueadas de 2-3 metros de largo, que generalmente superan a las hojas. Tienen flores blanquecinas hermafroditas, seguidas por frutos ovoides negruzcos de aproximadamente 0,5 cm de di ï metro producidos en una grande cantidad. Se reproduce f ï cilmente por semillas, que germinan en unos treinta d ï as.
Palmas de gran valor ornamental, distribuidas en todas las zonas de clima mediterr ï neo, donde pr ï cticamente se han naturalizado. La presencia, simult ï nea de otras plantas pertenecientes al mismo g ï nero como la ï *Washingtonia robusta*, con la qual puede f ï cilmente hibridizarse, ha actuado de tal manera que actualmente, en ciertas ï reas, existen en cultivo m ï s h ï bridos que las especies puras. No tiene ninguna exigencia de cultivo, adem ï s de una posici ï n a pleno sol, pero crece mejor en suelos alcalinos, incluso semi-ï ridos y pobres, y es bastante resistente a bajas temperaturas (-10 ï C, incluso algunos grados menos, por per ï odos cortos y en los climas secos).

Categor ï a: Palmeras
Familia: Arecaceae

Gï nero: Washigtonia
Especie: filifera
Zona Geogrï fica de Origen: Amï rica del norte
Zonas Climï ticas: Templado centro de Italia, sur de Italia Meseta Usda 9 a
Porte: Palmeras de mï s tallos
Hojas: Hoja en forma de abanico
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floraciï n: Ottobre / Luglio / Agosto / Settembre
Flor: Raï m (inflorescï ncia)
Colore Fiori: Giallo
Suelo: Medianamente acido / Neutro / Basico / Arena fina / Compacta / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Poca agua
Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol
Forma: Palmera
Colore Frutti: Nero
Perfumado: Si