
Ficus benyamina



La especie es originaria de Australia (Northern Territory y Queensland), Bhutï n, Camboya, China (Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan y Yunnan), Filipinas, India, Indonesia, Islas Salomï n, Malasia, Myanmar, Nepal, Papï a Nueva Guinea, Tailandia y Vietnam, donde vive en las forestas hï medas hasta cerca 800 m de altitud.

LaïFicus benjaminaï L. (1767) es un ï rbol siempreverde, alto hasta cerca 20 m con tronco de hasta 50 cm de diï metro, con corteza lisa de color blanco grisï ceo y copa amplia con eventual produccii n de raï ces aï reas de las ramas principales; las jï venes ramas son pï ndulas. Las hojas, mï s bien coriï ceas, sobre un corto pecï olo, son alternas, de forma de ovada a elï ptica con margen entero y ï pice acuminado, largas 3-10 cm y anchas 2-5 cm, de color verde oscuro brillante superiormente.

En la naturaleza puede crecer inicialmente como epï fito sobre otros ï rboles, circundando al tronco con sus raï ces que alcanzan el suelo, y que eventualmente termina por estrangular , luego de un cierto nï mero de aï os.

Se reproduce tambiï n por esqueje en primavera y acodo aï reo a inicios del verano. Especie muy difundida y apreciada en las zonas de clima tropical y subtropical por el veloz crecimiento y la elegante copa, expandida y densa, con delgadas ramas jï venes pï ndulas, ya sea como ejemplar aislado, en parques y grandes jardines, como en las arboledas callejeras.

Puede resistir de adulta descensos excepcionales de temperatura hasta cerca -3 ï C por breviï simo perï odo, si bien se daï a el follaje.

No es particularmente exigente en cuanto a suelo, aï n en un suelo pobre puede resistir de adulta a perï odos de sequï a, tiene tambiï n una moderada resistencia al viento y a la salobridad y soporta bastante bien las podas, ofrece desventajas la abundante produccii n de frutos, fastidiosos cuando caen sobre ï reas peatonales, y el aparato radical superficial e invadente, por lo que se debe tener en cuenta en el momento de plantar.

Como planta en maceta es una de las mï s populares para la decoracii n de interiores, en sus innumerables variedades, tambiï n variegadas, cultivarlas en posicii n muy luminosa a temperaturas superiores a los 12 ï C.

El problema que se repite mï s a menudo en apartamentos es la imprevista caï da de las hojas, si el

fenï meno es limitado y se presenta a inicios de invierno, se trata de un normal recambio foliar, si es consistente, las causas pueden ser diversas, una bastante frecuente es la variaciï n de la posiciï n, es una planta que no ama los cambios de lugar, si estos son necesarios, un fertilizante hidrosoluble, dado algunos dï as antes, puede ayudar a superar la crisis y minimizar la pï rdida del follaje. Otras causas pueden ser luz insuficiente, baja temperatura, atmï sfera muy seca, corrientes de aire y bruscas variaciones de temperatura.
Las podas, moderadas, se efectï an a fines de invierno, con el fin de mantener una forma compacta.ï
ï disponible bajo pedido

Categorï a: Planta de interior
Familia: Moraceae
Gï nero: Ficus
Especie: benjamin
Zona Geogrï fica de Origen: El sudeste de Asia / Asia, sub-continente indio
Zonas Climï ticas: Subtropical, sur de Italia e islas
Porte: Arbol
Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Verde ï Variegato
Periodo de Floraciï n: Maggio / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Flor: Flor simple
Colore Fiori: Giallo
Suelo: Medianamente acido / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Media agua
Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol
Forma: planta en caï a
Colore Frutti: Nero