
Palmier de Californie



Washingtonia filiferaï (Linden ex Andrï) H. Wendl. (1879) est originaire de l ouest des ï tats-Unis (Arizona et Californie) et du nord-ouest du Mexique (nord de la Basse Californie) oï il croit dans les zones semi-dï sertiques au fond des canyons, oï l eau est prï sente, ou ï proximitï de sources naturelles.
Le genre, qui ne comprend que deux espï ces, a ï tï dï diï au premier prï sident des ï tats-Unis, George Washington. Le nom de l espï ce provient des filaments prï sents entre les segments foliaires.
Ce palmier est connu dans les pays anglophones sous les noms de California fan palm, Washington palm, desert fan palm et petticoat palm.
Il prï sente un tronc solitaire, massif, d environ 60 ï 80 cm de diamï tre, gris dans la partie ancienne, brun rougeï tre dans la partie plus jeune, mesurant jusqu ï environ 20 m de hauteur, et ï largi ï la base, couvert, ï l ï tat sauvage, de feuilles sï ches persistantes, au sommet, d oï vient l un des nombreux noms communs sous lequel il est connu : palmier jupon. Les feuilles costapalmï es, opaques, sont de couleur vert clair, avec des segments bifides pendants munis de nombreux filaments sur la partie terminale, chez les sujets adultes. Les pï tioles possï dent des ï pines de couleur blanchï tre tendant ï ï tre plus petites et plus ï loignï es ï proximitï de la lame foliaire.
Les inflorescences de 2 ï 3 m de long, courbes, dï passent gï nï ralement des feuilles. Elles sont constituï es par de fleurs hermaphrodites blanchï tres, prï cï dant des fruits globuleux noirï tres d environ 0,5 cm de diamï tre, produits en grandes quantitï s. La reproduction est facile par semis, les graines germant en environ 30 jours.
Ce palmier d une grande valeur ornementale est rï pandu dans toutes les zones au climat mï diterranï en, oï il s est pratiquement naturalisï . La prï sence simultanï e d une autre espï ce appartenant au genre,ï Washingtonia robusta, avec laquelle il s hybride facilement, a conduit ï une situation telle que, dans certaines zones, on rencontre, en culture, plus d hybrides que d espï ces pures. Il n a pas d exigences culturales particuliï res, si ce n est un emplacement en plein soleil ; poussant mieux dans les sols alcalins, mï me semi-arides et pauvres, il est relativement rï sistant aux basses tempï ratures (-10 ï C, voire un peu moins, pendant de courtes pï riodes, sous les climats secs).

Catï gorie: Les palmiers

Famille: Arecaceae
Genre: Washigtonia
Espï ce: filifera
Zone Gï ographique d'Origine: Amï rique du nord
Zones Climatiques: Climat tempï rï de l'Italie centrale et des plateau du sud Usda 9 a
Port: Palmier ï stipes multiples
Feuilles: Feuille en ï ventail
Colore Foglie: Verde
Pï riode de Floraison: Ottobre / Luglio / Agosto / Settembre
Fleur: La grappe
Colore Fiori: Giallo
Sol: Moyennement acide / Neutre / Basique / Texture sableuse / Lourde / Moyenne sol
Besoins en Eau: Peu d'eau
Exposition ï la Lumiï re: Demi ombre / Plein soleil
Forme: Palmier
Colore Frutti: Nero
Parfumï : oui