
Figuier pleureur



La plante est originaire d Australie (Northern Territory et Queensland), Bhutan, Cambodge, Chine (Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan et Yunnan), Inde, Indonï sie, Malaisie, Myanmar, Nï pal, Papouasie Nouvelle Guinï e, Philippines, Iles Salomon, Thaï lande and Viet Nam, oï elle pousse dans les forï ts humides jusqu ï 800 m d altitude.
Est un arbre sempervirent (toujours vert), atteignant 20 m de hauteur, avec un tronc de 50 cm de diamï tre, ï l ï corce blanc grisï tre et une couronne ample avec production possible de racines aï riennes ï partir des branches principales; les jeunes branches sont pendantes. Les feuilles sont plutï t coriaces, sur un pï tiole court, alternes, de forme ovoï de ï elliptique avec un bord entier et bout pointu, de 3 ï 10 cm de long et 2 ï 5 cm de large, de couleur vert foncï sur la face supï rieure.
C est une espï ce trï s diffusï e et apprï ciï e dans les zones climatiques tropicales et subtropicales, grï ce ï sa croissance rapide et sa grande couronne ï lï gante et touffue, et avec ses jeunes branches pendantes, aussi bien en tant que spï cimen isolï , dans les parcs et jardins, que comme arbre dans la rue. A l ï ge adulte, il peut rï sister ï des baisses exceptionnelles de tempï rature, jusqu ï -3 ï C, pendant une courte pï riode, mï me si son feuillage peut en ï tre endommagï .
Le sol a peu d importance, mï me pauvre, il peut rï sister une fois adulte ï des pï riodes de sï cheresse; il a aussi une rï sistance modï rï e au vent et ï la salinitï , et porte assez bien l ï lagage. Les aspects nï gatifs sont la production abondante de fruits, ce qui est ennuyeux lorsqu ils tombent sur une zone de passage, et l appareil racinaire, superficiel et envahissant, qui doit ï tre soigneusement pris en compte lors de la plantation.
ï
En tant que plante d intï rieur, c est une des plantes les plus populaires pour la dï coration, grï ce ï ses variï tï s innombrables et bigarrï es; elle doit ï tre cultivï e en condition trï s lumineuse, ï une tempï rature supï rieure ï 12 ï C.
L arrosage doit ï tre abondant en ï tï , tout en ï vitant le surplus d eau stagnante qui peut se rï vï ler dangereuse, tout en permettant ï la terre de sï cher complï tement avant un nouvel arrosage; celui ci doit ï tre modï rï en hiver.
En appartement, le problï me le plus souvent rencontrï est la chute inattendue des feuilles : si le

phï nomï ne est limitï et se produit au dï but de l hiver, il s agit du remplacement normal des feuilles; s il est important, les causes peuvent ï tre diverses, une des plus frï quentes ï tant le changement de position, alors qu une plante n aime pas les dï placements; si nï cessaire, un engrais hydro soluble, donnï dans les jours prï cï dents peut aider ï surmonter cette crise et ï minimiser la perte du feuillage. D autres causes incluent une luminositï insuffisante, une tempï rature trop basse, une atmosphï re trop sï che, les courants d air ou des variations soudaines de tempï rature.
Les ï lagages, modï rï s, doivent ï tre rï alisï s fin de l hiver pour maintenir un aspect compact.
disponible sur demande

Catï gorie: Les plantes d'intï rieur
Famille: Moraceae
Genre: Ficus
Espï ce: benjamin
Zone Gï ographique d'Origine: Asie du sud est / Asie, sous-continent Indien
Zones Climatiques: Littoral subtropical, sud de l'Italie et ï les
Port: Arbre
Feuilles: Feuilles persistantes
Colore Foglie: Verde ï Variegato
Pï riode de Floraison: Maggio / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Fleur: Fleur simple
Colore Fiori: Giallo
Sol: Moyennement acide / Moyenne sol
Besoins en Eau: Eau moyenne
Exposition ï la Lumiï re: Demi ombre / Plein soleil
Forme: Tressage de canne
Colore Frutti: Nero