
L'oranger Moro



L'oranger Moro est une plante vigoureuse et assez rï sistante au froid. Ses feuilles persistantes sont longues et pointues. Sa floraison printaniï re est trï s parfumï e. C'est une variï tï prï coce, pour une orange sanguine. Elle peut ï tre cueillie dï s les mois de janvier-fï vrier en fonction de votre rï gion.
L'oranger Moro peut ï tre plantï en pleine terre en rï gion mï diterranï enne ou dans les rï gions de climat doux bien abritï du vent et du froid.
Partout, il peut ï tre cultivï en pot ou en bac et hivernï , d'octobre ï mars-avril, dans une vï randa ou une piï ce claire hors gel, (idï alement une tempï rature d environ + 10ï C).
Il est possible de le rempoter tous les 2 ï 3 ans dans un substrat spï cial agrumes avec des billes d'argile dans le fond du pot.
Arroser rï guliï rement, pour garder le terreau toujours frais, mais sans tremper. Rï duire l'arrosage en hiver, attendre que le terreau sï che sur les 2 premiers cm de surface.
L apport d un engrais spï cial agrume, rï guliï rement sauf en hiver, favorise la fructification et la beautï du feuillage.

Catï gorie: Citrus
Famille: Rutaceae
Genre: Citrus
Espï ce: sinensis "Moro"
Zone Gï ographique d'Origine: Europe mï diterranï enne
Zones Climatiques: Littoral subtropical, sud de l'Italie et ï les
Port: Arbre
Feuilles: Feuilles persistantes
Colore Foglie: Verde
Pï riode de Floraison: Gennaio / Febbraio / Marzo / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Fleur: Fleur simple
Colore Fiori: Bianco
Sol: Moyennement acide / Moyenne sol

Besoins en Eau: Eau moyenne
Exposition ï la Lumiï re: Demi ombre / Plein soleil
Forme: Tige
Pï riode de Fructification: Gennaio / Febbraio / Marzo / Novembre / Dicembre
Colore Frutti: Arancione ï Rosso
Parfumï :oui