
Chamaerops humilis



Le Chamaerops humilis L. (1753) est originaire de l ouest de la Mï diterranï e, notamment l Algï rie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l Italie (ouest de la Sicile et la Sardaigne), l Espagne et le Portugal. Il a ï tï probablement introduit il y a trï s longtemps le long des cï tes tyrrhï niennes de l Italie et dans le sud de la France. Il pousse de prï fï rence le long des cï tes rocheuses ou sur des sols arides, gï nï ralement calcaires, en plein soleil et jusqu ï 1.000 mï tres d altitude (en Afrique du Nord).
C est une plante dioï que, mais il y a des spï cimens, bien que rares, avec des fleurs hermaphrodites ; les inflorescences courtes, bien ramifiï es, portent des fleurs d une couleur jaune foncï . Les fruits ovoï des, de 1-2 cm de long, ont une couleur variant de l orange au brun. La plante se multiplie par graines, qui germent au bout d environ deux mois, et ï galement, avec une certaine difficultï , par division.
ï Le nom de genre vient du grec ï ï chamaiï ï = sur le terrain, et ï ï rhopsï ï = bosquet ; le nom de l espï ce vient du latin ï ï humilisï ï = faible. Les deux termes se rï fï rent ï l aspect de la plante.
Connu en Italie comme palma nana, palma di San Pietro, il est appelï en Sicile ciafagghiuni, giummarra, scuparina, scupazzu ; en Sardaigne : margaglio, pramma, paimmizzu ; en Espagne : palma de escobas, palma de palmitos, palmera enana ; au Portugal : palmeira ana, palmeira das vasouras ; en France : chamerops humble, palmier nain, palmite nain ; en Allemagne : Zwergpalme et dans les pays anglo-saxons : dwarf fan palm, et palm cabbage.
C est une espï ce d apparence trï s variable dans sa couleur et la forme de ses feuilles.
Habituellement, ce palmier a un aspect buissonnant, avec des stipes, d environ 15 ï 20 cm de diamï tre, couverts par des fibres brunes et par les pï tioles des feuilles dessï chï es. Les stipes, qui sont gï nï ralement bas, peuvent atteindre, dans des conditions optimales, 6-8 mï tres de hauteur. Les feuilles sont palmï es, assez rigides, et presque circulaires, d environ 60 cm de diamï tre, de couleur vert pï le sur la face supï rieure, et avec une pruine cireuse blanchï tre sur la face infï rieure, avec plusieurs segments bifurquï es dans la partie apicale. Les pï tioles, parfois de plus d un mï tre, sont ï quipï s avec de fortes ï pines le long des bords.
ï
ï

ï
ï
ï
ï
ï
ï

Actuellement, ce palmier est largement utilisï ï des fins ornementales dans les pays de climat mï diterranï en, soit pour son aspect soit pour sa grande adaptabilitï aux sols pauvres et arides et pour sa rï sistance aux basses tempï ratures (jusqu ï -12 ï C). Dans le passï , ce palmier avait, par contre, un rï le important ï la fois dans l alimentation ainsi que dans plusieurs artisanats. ï l ï poque romaine, l utilisation alimentaire des jeunes pousses ï tait connue dans certains endroits de la Sicile et en Afrique du Nord, et jusqu au dï but du XXe siï cle, les feuilles ont ï tï utilisï es dans la fabrication de paniers, chapeaux, ï ventails et balais (de nombreux noms communs dï rivent de ces utilisations).

Catï gorie: Les palmiers
Famille: Arecaceae
Genre: Chamaerops
Espï ce: humilis subsp. humilis
Zone Gï ographique d'Origine: Europe mï diterranï enne / Nord-Afrique Centrale
Zones Climatiques: Mï diterranï e, sud et ï les, collines. Usda 10 a
Port: Palmier ï stipes multiples
Feuilles: Feuille en ï ventail
Colore Foglie: Verde ï Grigio
Pï riode de Floraison: Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Fleur: La grappe
Colore Fiori: Giallo
Sol: Neutre / Calcaire / Moyenne sol
Besoins en Eau: Peu d'eau
Exposition ï la Lumiï re: Demi ombre / Plein soleil
Forme: Palmier
Colore Frutti: Viola