
Forstersche Kentia



Dieï**Forstersche Kentia**ï (*Howea forsteriana*), sie wird fast immer einfachï**Kentiapalme**ï genannt, ist eine auf der australischenïLord-Howe-Inselïendemischeï Palmenart.
Der Stamm von ausgewachsenen Exemplaren kann 15 bis 18ï m hoch werden, in Kultur erreichen sie jedoch meist nur die Hï lfte. Der Stammdurchmesser betrï gt 15ï cm, wobei die Basis geschwollen ist. Der Stamm ist grau bis hellbraun und dicht mit ringfï rmigen Blattnarben besetzt.
Die Blattkrone von ausgewachsenen Palmen ist 6ï m breit und 3,6 bis 4,5ï m hoch. Sie reicht etwas den Stamm hinab, ist aber nicht vï llig rund. Die Blï tter sind 2,4 bis 2,6ï m lang, der Blattstiel ist 1,2 bis 1,5ï m lang. Dieï Rhachisï ist gebogen. Die Fiederblï ttchen sind 60 bis 90ï cm lang, dunkelgrï n, schmal lanzettlich, schlaff und hï ngend. An der Blattbasis befinden sich viele braune, verwobene Blattfasern, die erst zusammen mit dem Blatt abfallen.
Dieï Blatt-Epidermisï ist an der Auï enseite etwas verdickt, an der Unterseite in den Interkostalfeldern auch etwasï papillï s. Die Nebenzellen derï Stomataï haben verdickte Wï nde, der mittlere Teil des Zell-Lumen ist eingeengt. Einï Palisadenparenchymï ist leicht differenziert. Es gibt reichlich Fasern, diese sind mit den adaxialen, eher kleinenï Hypodermis-Zellen verbunden.
Die Frï chte sind rund 5 cm lang, ellipsoidisch und zur Reife orangefarben oder rot.
ï

Kategorie: Zimmerpflanze
Familie: Arecaceae
Gattung: Howea
Art: forsteriana
Geographisches Ursprungsgebiet: Ozeanien
Klimazonen: Subtropisch, Sï ditalien und Inseln
Habitus: Einestï mmige Palme
Blï tter: Immergrï n
Colore Foglie: Verde
Blï teitperiode: Luglio / Agosto / Settembre

Blume: Traube
Colore Fiori: Giallo
Bodenart: Schwash sauer / Sand / Mittelschwer Erdreich
Erfordernissen: Mï ssig Wasser
Lichtexposition: Schatten / Halbschatten
Form: Palmen / Bï schel
Colore Frutti: Verde ï Arancione ï Viola